

Bijlage 1 - Aanvullingen en errata deel 1

Met dank aan Frank van der Meer, Stijn Schreven, Erik van der Spek, Hans Wiering † en Albert de Wilde.

Aanvullingen


H7 *Xylocopa* - houtbijen

► p.33. 10 juni 2020. Bunnik (Utrecht). *Xylocopa virginica* ♀ (gefotografeerd door Bram ter Keurs).

H8 Genera van bijen met één soort in Nederland

Dasypoda – pluimvoetbijen


In Nederland alleen *Dasypoda hirtipes* (pluimvoetbij). Verspreid over geheel Nederland; in (zee-) kleigebieden alleen gevonden op opgespoten, droge zandige terreinen. Ze graaft zelf haar nest in de grond en nestelt vaak in grote groepen bij elkaar. De vrouwen verzamelen stuifmeel voor hun larven van gele composieten zoals biggenkruid, streepzaad, havikskruiden en leeuwentand. De mannetjes patrouilleren in hoge snelheid langs nestplekken en voedselplanten waar de vrouwtjes te vinden zijn. Vliegtijd: juni-augustus.



Dasypoda hirtipes, vrouwtje pluimvoetbij.

Epeoloides – bonte viltbijen

In Nederland alleen *Epeoloides coecutiens* (bonte viltbij). Tot op heden vooral verspreid over het oostelijk deel van ons land, maar zal haar gastheer naar het westen volgen. Opvallend gekleurde koekoeksbijen die parasiteren in de grondbijen van slobkousbijen (*Macropis*). Meestal te vinden in vochtige habitats met veel wederik (*Lysimachia*), de belangrijkste vliegplant van haar gastheer. Vliegtijd: juni-augustus.



Epeoloides coecutiens, mannetje bonte viltbij.

H9 *Anthidium* – wolbijen

► p.53. 30 juli 2019. Ede. *Anthidium septemspinosum*; zwartpootwolbij ♀ (leg. Theo Zeegers).

H22 *Nomada* - wespbijen

► p.103. 13 juni 2020. Eys. *Nomada braunsiana* ♂ (leg. Tjomme Fernhout).

► p.103. 15 juni 2019. Eys. *Nomada facilis* ♂ (leg. Flor Rhebergen).

Errata

- ▶ Algemeen: antennenleden moet zijn: antenneleden.
- ▶ In Inhoudsopgave tussen 8 en 9 invoegen:
Beeldindex. Afbeeldingen van de genera in deel 1 (met paginaverwijzing).
- ▶ p. 7. Summary. Tweede zin: '1' en NIET all bee species. (All in deel 1 en 2!) r. 6: discusses = discuss. r. 8: table = key. Eén na laatste zin: Nederlandse Fauna = Natuur van Nederland.
- ▶ p. 9. Linker kolom: in r. 2. moet 1× kunnen weg. Bouwmannetje = Bouwman. Rechter kolom: r.5. Krusemannetje = Kruseman. r.15. werden = werd. r.27: achter determinatietabellen een komma.
- ▶ p. 37. 12b. *Tetralonia*, moet zijn: *Eucera* (subg. *Tetralonia*)
- ▶ p. 46. *Chalicodoma* vervangen door *Megachile* (subg. *Chalicodoma*)
- ▶ p. 46/47. *Dasypoda* ontbreekt, zowel tekst als foto. *Epeoloides* idem.
- ▶ p. 48. *Tetralonia* moet zijn *Eucera* (subg. *Tetralonia*)
- ▶ p. 52. Bijschrift onder derde foto in linker kolom: '*Panurgus banksianus*, mannetje grote roetbij' moet zijn: '*Panurgus calcaratus*, mannetje kleine roetbij'.
- ▶ p. 60. 'Tabel tot ... soorten *Anthophora*.' weg.
- ▶ p. 65. Fig. 15 en Fig. 16. Toevoegen: ventraal.
- ▶ p. 66. 14b. S6 = T6.
- ▶ p. 67. r. 6. verzameld = verzamelt.
- ▶ p. 75. 7a. 'Sterniet 9 (Fig. 6a)' weg. Toevoegen van '(Fig. 6a)' achter 'rood pygidiaalveld'.
- ▶ p. 75. 7b. 'Sterniet 9 (Fig. 6b)' weg. Toevoegen, achter 'donker pygidiaalveld' Fig. 6b.
- ▶ p. 75. Ondertitel Fig. 6a. 'Sterniet 9' vervangen door pygidiaalveld.
- ▶ p. 75. Ondertitel Fig. 6b. 'Sterniet 9' vervangen door pygidiaalveld.
- ▶ p. 76. Bij 3. 'naar binnen gebogen' toevoegen: 'en aan het einde verbreed (breder dan de basis).'
- ▶ p. 76. Bij 4. 'achterpoten recht', toevoegen: 'overal even breed'.
- ▶ p. 78. Linker kolom: 1a. strepen = tekening. Rechter kolom: Fig. 4. Drie tanden van *Hylaeus*.
- ▶ p. 78. Namen bij Fig. 3. Streepje bij Penisvalve verder doortrekken. Accolade bij gonoforceps moet alleen gonocoxiet en gonostylus omvatten.
- ▶ p. 79. 8a. Vierde regel: 'het pronotum is meestal zwart'.
- ▶ p. 79. 9a. Toevoegen: callus crème kleurig. Vlek op de clypeus klein: raakt niet de basis van de antennen.
- ▶ p. 80. 9b. Toevoegen: callus fel geel. Vlek op de clypeus groot: raakt de basis van de antennen.
- ▶ p. 80. 12b. 'clypeus niet of licht ingesneden'.
- ▶ p. 81. 15b. kop vrij rond met meestal kleine (soms grote) enz.
- ▶ p.83 en p.89. Verwijderen van '(= *H. gibbus* auct.)'. De Zuidelijke weidemaskerbij *H. gibbus* is zover bekend nog niet in NL aangetroffen. Gebruik Straka & Bogusch, 2011 om *H. gibbus* te onderscheiden van *H. incongruus*.
- ▶ p. 84. bij 29b. Weghalen: (vgl.12 *H. variegatus*).
- ▶ p. 91. Linker kolom: olieën = oliën. 1b. streepje weg bij antennenlede-n. 2a. zuidelijkeoostlijke = zuidoostelijke. Rechter kolom: Fig. 1 en Fig. 2 zijn kaken van *Hylaeus*; de *Macropis* afbeeldingen ontbreken.
- ▶ p. 93. 5a. Moet zijn: 'meerdere vrouwtjes'.
- ▶ p. 94. 9a. Toevoegen: 'voetleden poot 1 met lange haren (2 × basitarsus)'. 9b. Toevoegen: 'voetleden poot 1 met korte haren (hooguit 1,5 × basitarsus)'.
- ▶ p. 99. Fig. 41. Gonotylus = gonostylus.
- ▶ p. 136. Panurgus: Fig. 1 en 2 zijn omgewisseld.
- ▶ p. 138. 5a. 'Achterkoprand' is een verwarrende term. Lees: de koprand vormt naar beneden toe langs de slapen enz. Fig. 5 vervangen door kop van opzij!
- ▶ p. 139. 6a. Na '...basishelft gepunt' toevoegen 'm.u.v. de uiterste zijanten'.
- ▶ p. 139. 10a. 'dichte witte gezichtsbehaaring' hier weg, verplaatsen naar p.144 27b.
- ▶ p. 140. Fig. 9a en 9b: T1 moet zijn scutum!
- ▶ p. 142. 18a. Tekst vervalt en wordt: Antennelid 5 is langer dan 3 en ongeveer zo lang als 6. T2 is fijn gepunteerd of glad. Pygidium smal. 4,5 – 7,0 mm. Naar 19.
- ▶ p. 142/18b. Tekst vervalt en wordt: Antenneleden 3, 4 en 5 ongeveer even lang, elk korter dan breed, geen van alle zo lang als 6. Ten minste 1/3 van T2 en basale deel T3 met duidelijke stippels. Pygidium vrij breed. 5 – 7 mm. Naar 20.
- ▶ p. 171. Hfd. 11. Fig. 5, 7 en 8. zijn NIET van Stijn Schreven, maar van J.J.A.M. Wessendorp (uit G. van der Zanden, 1982).
- ▶ p. 172. Colofon. Omslag foto: *Macropis Europaea* = *Macropis europaea*.